

Solunum Sıkıntısı veya
Takipne veya
SPO₂ < %93 veya
Taşikardi

VAR

YOK

Belirlenen Servise Yatış*

Komorbid Hastalık veya
Yaş>50

VAR

YOK

Tam Kan,
CRP
+
PA Akc veya BT**

Tam Kan CRP, Biyokimya
Kan Gazı, D-Dimer
PA Akc veya BT**

Ağır pnömoni bulguları

Normal veya hafif pnömoni bulguları

Belirlenen Servise Yatış*

Test (PCR)

Sonuç çıkana kadar
Evde izolasyon ve Takip

Ampirik Tedavi: Oseltamivir¹ + Hidroksiklorokin² ± Antibiyotik

Test sonucu

Negatif

Pozitif

Hastalık Bulguları

Hidroksiklorokin³ başlanır
Evde tedavi kurallarına
göre takip edilir

Test (PCR)

Negatif

Pozitif

Düzelmiş

İlerlemiş

Ampirik Tedaviyi Kes
Alternatif Tanıları Düşün

24 saat sonra PCR tekrar

Negatif

COVID Tedavisine devam

Semptom başlangıcından 7
gün sonrasına kadar evde
izole takip edilir

Hastaneye çağrılarak
yatış ve test tekrarı açısından
yeniden değerlendirilir



Servis*

YBÜ'ne yatış kriterleri olan hastalar yoğun bakım ünitesine yatırılır.

BT** ⚠️

Ateş + öksürük – Akciğer grafisi doğal: Kontrastsız düşük doz BT

Ateş + öksürük – Akciğer grafisi tanısal/tanısal değil: Kontrastsız düşük doz BT

Ateş + öksürük + komorbid hastalık veya Yaş>50 + tanısal olmayan akciğer grafisi:

Kontrastsız tam doz BT, başka bir hastalık nedeniyle endikasyon varsa kontrastlı BT çekilir

⚠️ 20 yaş altındaki genç kadınlarda BT çekilmesinden kaçınılmalıdır.

⚠️ Çapraz bulaşı önlemek için her hastadan sonra BT cihazı uygun şekilde temizlenmelidir.

¹Influenza testi negatif bulunan hastalarda kesilebilir

²Kardiyak aritmi öyküsü olan veya QT mesafesini uzatan ilaç kullanan kişilerde hidroksiklorokin başlanmadan önce EKG çekilmesi gerekir.

³Çocuk hastalarda klorokin sadece ağır olgularda kullanılır