

2. VE 3. BASAMAK SAĞLIK KURULUŞLARINDA
VAKA YÖNETİMİ AKIŞ ŞEMASI

**ATEŞ VE/VEYA SOLUNUM YOLU ENFEKSİYONU
BULGULARI (ÖKSÜRÜK, NEFES DARLIĞI) VAR MI?**

EVET

**HASTAYA TIBBİ MASKE TAKILARAK
DİĞER HASTALARDAN AYRI BİR MUAYENE BİRİMİNE ALINIR.**

COVID-19 OLASI OLGU TANIMINA UYUYOR MU?

EVET

**BAŞVURDUĞU HASTANEDE, BU HASTALAR İÇİN
DAHA ÖNCE BELİRLENMİŞ OLAN BİRİMDE/ALANDA
İZOLE EDİLİR. DAMLACIK VE TEMAS İZOLASYON KURALLARI
UYGULANARAK İZLENİR.**

**HASTADAN COVID-19 REHBERİ'NE GÖRE
SOLUNUM YOLU ÖRNEĞİ ALINIR.**

Örnek Negatif

Örnek Pozitif

Alternatif tanıya yönelik tedavi verilir

COVID-19 tanısı ile güncel literatürdeki ve
COVID-19 Rehberi'ndeki bilgiler ışığında uygun
şekilde tedavi edilir

Tedaviye rağmen semptomlarda
48 saat sonra düzelme

Var

Yok

Kesinleşen olgulardan
yoğun bakım ihtiyacı
olan veya entübe
edilen hastalar 2.- 3.
düzey yoğun bakım
ünitelerinde izolasyon
odalarında takip edilir

Alternatif tanıya
yönelik tedavi
verilerek evde 14
gün süre ile
izolasyona
devam etmek
kaydı ile taburcu
edilir

Hastadan ikinci
defa COVID-19
tanısı için 2. örnek
gönderilir.

Örnek Pozitif

Örnek Negatif

İyileşen hastalarda taburculuk için en az 24 saat
arayla alınan iki solunum yolu örneğinin negatif
sonuçlanması beklenmelidir.

COVID-19 dışlanır,
hastalığına yönelik
tedavi edilir.